OCT 3 0 1929

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR

(Prix du présent fascicule : 2 fr.)

42896

MÉLANGES EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES

LIBRARY
MUS. COMP. ZOOLOGY

QUATORZIÈME FASCICULE

(12 avril 1915)

PAR

MAURICE PIC

OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE
DIRECTEUR DE L'« ÉCHANGE »
CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS
MEMBRE DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES
DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

MOULINS
IMPRIMERIE ÉTIENNE AUCLAIRE
ANCIENNE MAISON C. DESROSIERS

1915

Tous droits réservés

LIBRARY
MUS. COMP. ZOOLOGY,
CAMBRIDGE, MASS.

INTRODUCTION

Comme je l'ai fait en composant les derniers fascicules parus, je rédigerai mes diagnoses latines d'une façon uniforme, en les mettant toutes au masculin, quand bien même le genre serait neutre ou féminin.

En adoptant cette rédaction *unifiée*, je pense réaliser un progrès sérieux, tout au moins *raisonné*. Pour comprendre cet unique accord masculin, il faut sous-entendre, dans chaque diagnose, le mot *insectus*. Je renvoie les entomologistes non convaincus de l'opportunité de cette méthode, à la note précédemment publiée, à titre explicatif (*Mélanges*, XI, p. 13) et j'ajoute, en plus, quelques réflexions. En masculinisant toutes les diagnoses, je poursuis un double but : faciliter leur compréhension, réaliser une unification simple et pratique. Ce système doit éviter de fastidieuses dissertations grammaticales, ou peut supprimer des interprétations étymologiques complexes, c'est donc assez pour qu'il se recommande à la bienveillante attention des entomologistes. Je n'insiste pas davantage sur ce sujet, espérant que ces courtes réflexions suffiront à désarmer la terrible *Critique* (habituellement montée en puissante machine de guerre), tout au moins à la réduire au *demi-silence*.

⁂

Nota. — Toutes les nouveautés décrites dans le présent fascicule font partie de ma collection.

NOUVEAUTÉS RENTRANT DANS DIVERSES FAMILLES

Formicomus unifasciatus v. nov. diversus. Thorace antice parum convexo, postice distincte tuberculato ; elytris antice plene fasciatis. Bornéo : Martapura.

Diffère de la forme type par le prothorax moins bombé sur sa partie antérieure avec les tubercules postérieurs plus saillants, en outre la bande testacée antérieure des élytres atteint la suture.

Formicomus spinifer v. nov. Gerardi. ♀ Grandis, elytris infasciatis. L. 5,5 mill. Congo (P. Gerard).

Cette variété, de grande taille, a les élytres subparallèles, d'un noir à peine verdâtre et dépourvus de fascies pileuses blanches.

Pseudoleptaleus semiplicatus n. sp. Oblongus, nitidus, nigro-piceus, antennis ad basin pedibusque pro parte testaceis, elytris antice testaceo fasciatis ; thorace capiteque plicatis.

Oblong, brillant, éparsément pubescent, noir de poix, plus clair sur l'avant-corps, avec la base des antennes et partie des pattes testacées, élytres ornés d'une bande posthumérale étroite testacée, revêtue de poils argentés, celle-ci placée dans une forte dépression. Tête et prothorax longitudinalement plissés, la première grosse, subarquée postérieurement, le second un peu plus long que large, fortement dilaté-arrondi en avant, à base non élevée ; élytres assez courts et larges, finement ponctués ; pattes assez robustes. Long. 3 mill. environ. Guatemala.

Ressemble à *P. bicallosus* Pic par la plicature de son avant-corps, mais tête plus courte et plus grosse, callosités des élytres plus fortes, etc.

Pseudoleptaleus plicaticeps n. sp. Satis elongatus, nitidus, nigro-piceus, antennis ad basin pedibusque pro parte testaceis, elytris antice albido fasciatis ; capite plicato.

Assez allongé, orné de quelques longs poils dressés,

brillant, noir de poix, base des antennes et partie des pattes testacées, élytres ornés, en dessous des épaules, d'une étroite fascie de poils argentés placée dans une forte dépression. Tête rétrécie et subarquée postérieurement, marquée de petits plis longitudinaux ; prothorax presque lisse, assez large, modérément globuleux antérieurement et très élevé sur le disque, un peu élevé et bituberculé sur la base ; élytres bien plus larges que le prothorax, assez longs, rétrécis à l'extrémité, à ponctuation fine et espacée, pattes assez robustes. Long. 3 mill. Bolivie.

Très distinct de l'espèce précédente par le prothorax non plissé et de structure différente.

Pseudoleptaleus subfasciatus n. sp. Satis latus, nitidus, concolor, nigro-piceus, elytris fere indistincte fasciatis.

Assez large, brillant, presque glabre, de coloration uniforme, d'un noir de poix, élytres indistinctement fasciés de gris en dessous des épaules. Tête rétrécie et arquée postérieurement, à ponctuation fine et en partie écartée ; prothorax presque lisse, un peu plus long que large, fortement dilaté-arrondi en avant, à base peu élevée ; élytres bien plus larges que le prothorax, assez courts, atténués postérieurement, fortement impressionnés en dessous des épaules ; pattes moyennes. Long. 3 mill. environ. Colombie.

Voisin de *P. gibbicollis* Laf., élytres moins allongés, tête non réticulée mais ponctuée.

Pseudoleptaleus Chevrolati n. sp. Satis elongatus, nitidus, niger, antennis ad basin pedibusque pro parte rufescentibus, elytris antice argenteo fasciatis.

Assez allongé, brillant, presque glabre, noir avec la base des antennes et partie des pattes roussâtres, élytres ornés, en dessous des épaules, d'une étroite fascie argentée située dans une forte dépression. Tête rétrécie et arquée postérieurement, à ponctuation dense et en partie granuleuse entre les yeux, éparsément ponctuée sur le vertex ; prothorax presque lisse, un peu plus long que

large, modérément globuleux antérieurement, un peu élevé et bituberculé à la base ; élytres bien plus larges que le prothorax, assez longs, atténués postérieurement, fortement impressionnés en dessous des épaules ; pattes moyennes. Long. 3,5 mill. Colombie.

Diffère nettement de l'espèce précédente par la forme plus allongée et la ponctuation différente de la tête.

Pseudoleptaleus albicinctus v. nov. semirufus. Rufo-testaceus, antennis ad basin pedibusque pallidioribus, elytris nigro-piceis, antice testaceo et argenteo fasciatis. Long. 2,5 mill. République Argentine.

Cette variété se distingue de *P. albicinctus* Chevr. au moins par la coloration plus claire de son avant-corps ; la tête est médiocrement ponctuée et les élytres sont assez allongés.

Leptaleus Crampeli n. sp. Elongatus, subnitidus, nigro-piceus, antennis ad basin tarsisque plus minusve testaceis, elytris antice et lateraliter albo maculatis.

Allongé, peu brillant, orné d'une pubescence grise, fine et espacée, noir de poix avec la base des antennes et les tarses plus ou moins testacés, cuisses rembrunies, élytres ornés sur chacun, vers les épaules, d'une macule transversale blanche située dans une forte dépression, celle-ci n'atteignant pas la suture. Tête fortement et densément ponctuée, subarquée postérieurement ; antennes longues, subfiliformes ; prothorax plus long que large, fortement dilaté-arrondi en avant, presque droit et densément ponctué sur la base, élytres assez longs, subparallèles, courtement rétrécis à l'extrémité, finement ponctués, ornés de deux fortes gibbosités prescutellaires ; cuisses un peu épaissies, tarses antérieurs testacés, courts, avec le 1er article grand et épais, les postérieurs grêles, en partie foncés. Long. 3,5 mill. Congo : Fort Crampel. Acquis de Le Moult.

Voisin de *L. Archambaulti Pic*, mais tarses antérieurs de structure différente, aspect moins brillant, etc.

Anthicus elisicollis v. nov. subunicolor. Niger, anten-

nis femoribusque ad basin tarsisque testaceis. Long. près de 3 mill. Kamerun.

De coloration uniforme, foncée sur le dessus du corps, pattes foncées avec la base des cuisses et les tarses testacés ou roussâtres.

Anthicus æneipennis n. sp. Satis elongatus, niger, elytris æneis nitidisque.

Assez allongé, noir avec l'avant-corps densément ponctué et mat, élytres bronzés et brillants, fortement ponctués, fortement triimpressionnés vers la base. Tête grosse, subarquée ; antennes noires, épaissies à l'extrémité ; prothorax long, fortement dilaté-arrondi en avant, presque droit sur les côtés postérieurs ; élytres assez longs, atténués à l'extrémité, ornés de longs poils gris ; pattes noires, assez robustes. Long. près de 4 mill. Cambodge.

Cette espèce, très distincte pas sa coloration, peut prendre place près de *A. opaciceps* Pic.

Anthicus Lajoyei n. sp. Elongatus, nitidus, niger, antennis, tibiis tarsisque testaceis.

Allongé, brillant, éparsément pubescent de gris, entièrement noir avec les antennes, tibias et tarses testacés. Tête rétrécie et conique postérieurement, à ponctuation forte, un peu écartée ; antennes assez longues et grêles, un peu épaissies à l'extrémité ; prothorax assez court, modérément élargi et subarrondi en avant, droit sur les côtés postérieurs, base nettement bituberculée, plus fortement et plus densément ponctué en arrière qu'antérieurement ; élytres allongés, subparallèles, courtement rétrécis à l'extrémité, subtronqués au sommet, à ponctuation pas très forte et peu rapprochée ; cuisses un peu épaissies. Long. 4 mill. environ. Chine : Tien-Tsin (ex coll. Lajoye).

A placer près de *A. Raffrayi* Pic dont il se distingue, à première vue, par la coloration foncée du dessus du corps.

Hylophilus (Euglenes) Revoili n. sp. Oblongus, niti-

dus, mediocre griseo-holosericeo pubescens, testaceus, oculis nigris.

Oblong, brillant, revêtu d'une pubescence grise et soyeuse, fine, pas très fournie, brillant, entièrement testacé avec les yeux noirs, abdomen et extrémité des antennes un peu rembrunis. Tête subarquée postérieurement, finement ponctuée, yeux moyens, écartés ; antennes grêles, à 2e article gros, 3e long et mince, plus long que 4e, derniers un peu épaissis, terminal subacuminé ; prothorax transversal, à angles antérieurs subanguleux, à ponctuation forte, assez écartée sur le disque ; élytres courts et larges, atténués postérieurement, fortement et assez densément ponctués, faiblement impressionnés antérieurement ; pattes moyennes. Long. 2 mill. environ. Zanzibar (G. Révoil).

Peut se placer près de *H. longipennis* Pic, dont il se distingue par les antennes plus grêles, la ponctuation moins forte, la pubescence plus fine.

Pseudomorocaulus nov. gen. Oculis validis, approximatis ; palpárum articulo ultimo subtriangulare ; antennis satis validis, punctatis ; thorace transverso, marginato ; pedibus satis validis, tibiis posticis simplicibus.

Diffère de *Morocaulus* Frm. par les yeux distants quoique rapprochés et les tibias postérieurs non élargis en palette.

Pseudomorocaulus rufonotatus n. sp. Subparallelus, subdepressus, parum nitidus, rufo-testaceus, elytris nigro-cæruleis, ad humeros longe rufo notatis.

Subparallèle, peu allongé, un peu déprimé en dessus et à peine brillant, roux avec les élytres d'un noir bleuâtre, ceux-ci longuement maculés de roux vers les épaules. Tête courte, à épistome arqué, un peu surélevé ; yeux grands, assez rapprochés ; antennes robustes, à deuxième article court ; prothorax transversal, impressionné sur le disque, alutacé et marqué de quelques gros points écartés ; élytres un peu plus larges que le prothorax, pas très longs, fortement striés-ponctués avec les intervalles

un peu convexes ; pattes assez robustes, tibias postérieurs simples. Long. 7 mill. Gabon : Benito.

Allecula (Dietopsis) congoensis n. sp. Elongatus, nitidus, nigro-piceus, thorace rufescente, antennis ad basin, mandibulis femoribusque ad basin testaceis.

Allongé, brillant, éparsément pubescent de gris, noir de poix avec le prothorax roussâtre, base des antennes et des cuisses, ainsi que les mandibules testacés. Avant-corps à ponctuation pupilleuse, celle de la tête plus dense, tête plus étroite que le prothorax ; antennes longues et grêles, un peu épaissies et noires à l'extrémité ; prothorax assez étroit, subarqué sur les côtés, un peu rétréci en arrière, bien plus étroit que les élytres qui sont longs, atténués à l'extrémité, strié-ponctués ; pattes assez robustes. Long. 5,5 mill. Congo : Kissabé.

Peut se placer près de *A. longipennis* Qued., plus brillant avec le prothorax de coloration plus claire.

Synallecula Crampeli n. sp. Elongatus, testaceus, antennis pedibusque pro majore parte nigris ; capite thoraceque densissime punctatis, subopacis, elytris grosse punctatis.

Allongé, un peu atténué aux deux extrémités, pubescent de flave testacé, un peu roussâtre par place, avec les antennes et les pattes, moins la base des cuisses, noires, avant-corps à ponctuation ruguleuse ou pupilleuse dense, subopaque, élytres un peu brillants, à ponctuation profonde et large, débordant les stries, intervalles étroits ; pattes robustes. Long. 5 mill. Congo français : Fort Crampel.

Cette espèce, voisine de *S. longipennis* Pic par sa forme allongée, est remarquable par la forte ponctuation de ses élytres et son prothorax plus court.

Eletica unicolor n. sp. Parum elongatus, nitidus, niger, infra corpore griseo aut luteo pubescente.

Peu allongé, brillant, entièrement noir, dessous du corps pubescent de gris ou de jaunâtre. Tête longue, sillonnée sur le vertex, à ponctuation forte, écartée, sur

cette partie ; prothorax court, rétréci en avant, densément ponctué et à peine pubescent sur cette partie, lisse et éparsément ponctué en arrière et modérément impressionné sur le disque ; élytres larges, pas très longs, un peu rétrécis au milieu, marqués de côtes discales à peine indiquées et de plis transversaux irréguliers. Long. 27 mill. Côte d'Ivoire : Dimbroko.

Très voisin de *E. longipennis* Pic, forme moins allongée et tête à ponctuation plus écartée sur le vertex.

Eletica gigantea v. nov. rufocincta. Niger, capite postice rufo notato, elytris nigris, rufo cinctis. Long. 45 mill. Indes.

Lytta karibibensis n. sp. Elongatus, parum nitidus, niger, labro antice epistomaque rufo-testaceo notatis, thorace testaceo, antennis ad basin rufo maculatis, onguiculis rufis.

Allongé, peu brillant, noir avec le prothorax testacé, épistome en avant et tête, sur le vertex, maculée de roux testacé, antennes à premiers articles maculés de roux, tarses roux. Tête plus large que le prothorax, à ponctuation forte, rapprochée ; antennes n'atteignant pas le milieu des élytres ; prothorax assez étroit, atténué et déprimé en avant, impressionné en arrière, à ponctuation forte, irrégulièrement espacée ; élytres bien plus larges que le prothorax, un peu étranglés vers le milieu, rugueux avec des traces de côtes discales. Long. 27 mill. Afrique méridionale-occidentale : Karibib.

Espèce voisine de *L. bicolor* Fahr., dont elle paraît différer par la tête plus large, à ponctuation peu écartée, et les antennes maculées de roux à la base.

Zonabris (Ceroctis) subtrinotata. Modice elongatus, subnitidus, argenteo-pubescens, niger, elytris testaceis, apice nigris et testaceo maculatis.

Modérément allongé, un peu brillant, orné d'une pubescence argentée avec quelques poils obscurs dressés sur l'avant-corps, noir, élytres testacés sur les deux tiers antérieurs avec le pourtour de l'écusson et la base de

la suture foncés, noir sur le tiers apical avec, sur chaque élytre, au milieu de la coloration noire, trois macules testacées : deux transversalement placées, une antéapicale ; la partie noire est dentelée antérieurement. Long. 15 mill. Afrique orientale allemande : Liridi.

Cette espèce, très distincte par le dessin des élytres, peut se placer près de *C. Grondali* Bilb.

Acropteron apicicorne n. sp. Parum nitidus, rufo-æneus, antennis pedibusque pro parte testaceis, pro parte brunnescentibus.

Peu brillant, roux-bronzé avec les élytres à coloration foncière plus claire et le sommet de l'abdomen roux, antennes d'un brun foncé, avec la base et les trois derniers articles testacés, pattes testacées, sommet des cuisses, base des tibias et tarses rembrunis. Tête alutacée, à ponctuation médiocre, espacée, à impression antérieure arquée ; antennes assez longues ; prothorax subcarré, à angles un peu saillants, à ponctuation dense, assez forte et sillon basal continu ; élytres de la largeur du prothorax, longs et étroits, acuminés au sommet, faiblement striés et fortement ponctués avec les intervalles étroits ; tibias antérieurs arqués, postérieurs subanguleux en dedans. Long. 7 mill. Amazones.

Diffère de *A. laevipes* Chp. (ex description) par les angles antérieurs du prothorax non proéminents et la coloration des pattes.

Calymmaderus sericeomaculatus n. sp. Oblongus, postice mediocre attenuatus, nitidus, niger, capite rufescente, pro parte sericeo pubescens.

Oblong, modérément rétréci postérieurement, brillant, noir avec la tête roussâtre, revêtu d'une pubescence grise soyeuse, pas très dense et dessinant des mouchetures irrégulières sur les élytres. Prothorax court, rétréci en avant, marqué de points médiocres, espacés ; élytres pas très larges, à épaules marquées, ayant deux faibles stries latérales et, sur le dessus, des points médiocres espacés. Long. 3,5 mill. Brésil : Mineiro.

Diffère, à première vue, de *C. variegatus* Pic par la

pubescence foncière moins serrée, irrégulière et les élytres plus courts.

Calymmaderus aeneus n. sp. Minutus, subovatus, nitidissimus, supra æneus.

Petit, subovalaire, très brillant, noir avec le dessus bronzé ; tête et prothorax finement ponctué, ce dernier plus éparsément ; élytres un peu rétrécis à l'extrémité, à rangées de points allongés avec une strie latérale faible. Long. 2 ½ mill. environ. Chili.

Cette espèce, très distincte par sa coloration bronzée, peut prendre place près de *C. nitidus* Lec.

Aploglossa Lajoyei, v. nov. atricollis. Capite postice thoraceque nigris, elytris rufescentibus. Long. 8 mill. Vénézuela : Merida.

Variété distincte, à première vue, de la forme type par le prothorax entièrement noir.

Mesocyphon rufescens n. sp. Satis elongatus, nitidus, rufus, thorace lateraliter, antennis ad basin, pedibus abdomineque pallidioribus, oculis nigris.

Assez allongé, brillant, roux avec les côtés du prothorax, la base des antennes, les pattes et l'abdomen plus clairs. Tête grosse, yeux très brillants, mandibules longues ; antennes grêles et longues ; prothorax transversal, fortement explané et subarrondi sur les côtés, granuleux sur le disque ; élytres un peu plus larges que le prothorax, subparallèles, courtement rétrécis au sommet, assez longs, à ponctuation granuleuse écartée. Long. 6 mill. Bornéo.

Peut se placer près de *M. granulatus* Broun., mais prothorax différent, antennes plus longues, etc.

Laius martapuranus n. sp. Oblongus, subopacus, niger, elytris cyanescentibus, abdomine rufescente ; articulo 1° antennarum breve, 2° elongato, his dilatatis.

Oblong, subopaque, noir avec les élytres bleutés, abdomen roussâtre, très densément et ruguleusement ponctué. Tête, avec les yeux, plus large que le prothorax,

ayant sur le front une fine carène, antennes assez longues, à premier article court et dilaté, 2e long et épais, 3e plus large que les suivants ; prothorax assez long, rétréci aux deux extrémités, déprimé sur la base ; élytres bien plus larges que le prothorax, élargis en arrière, un peu déprimés en avant, subconvexes postérieurement ; pattes assez robustes. Long. 3 mill. Bornéo : Martapura.

Diffère de *L. incornutus* Pic par le front finement caréné, le 2e article des antennes plus robuste.

Lobatomixis nov. gen. Capite excavato, antennis elongatis, ante oculos insertis ; elytris apice plicatis et spinosis ; abdomine apice nigro appendiculato.

Ce genre, voisin de *Mixis* Ab. par la terminaison des élytres, est remarquable par la structure de l'abdomen, celui-ci étant muni au sommet, de chaque côté, d'un long appendice en forme de palette, noir, flanqué d'une sorte d'épine, non visible en dessus.

Lobatomixis cavifrons n. sp. Latus, postice dilatatus, nitidus, niger, antennis ad basin, infra abdomineque pro parte testaceis, elytris rubro-testaceis, ad basin et ad medium nigro-violaceo maculatis.

Large, un peu élargi postérieurement, orné d'une pubescence grise, éparse et couchée, brillant, noir avec le dessous des premiers articles des antennes et partie de l'abdomen testacés ; élytres testacé-rougeâtre, ornés d'une grande macule basale et d'une macule médiane isolée de la suture, celles-ci d'un noir violacé ; avant-corps finement ponctué. Tête large, un peu creusée sur le front ; prothorax large, presque de la largeur des élytres, un peu rétréci et explané en arrière, élytres larges et courts, plus larges en arrière, plissés au sommet et munis d'une épine effilée, à ponctuation assez fine, rapprochée ; pattes longues, tibias postérieurs un peu arqués. Long. 3,5 mill. Indes.

Attalus s.-g. nov. Indiattalus. Elytris inhirsutis, nitidis, apice in mare tumefactis facile distinguendus.

Par ses élytres brillants, sans poils dressés et munis

au sommet chez ♂ d'un court et large appendice impressionné au sommet, se rapproche, et se distingue en même temps, du sous-genre *Ebaeimorphus* Ab. Les antennes sont simples, le 2e article des tarses antérieurs ♂ sinué, appendiculé, la forme du corps allongée.

Attalus (Indiattalus) diversipennis n. sp. Elongatus, postice parum dilatatus, nitidus, niger, thorace testaceo, antennis ad basin pedibusque pro parte testaceis, elytris concoloribus ♀, aut ante apicem albo notatis ♂.

Allongé, faiblement élargi postérieurement, presque glabre et peu ponctué, brillant, noir avec le prothorax testacé, base des antennes et pattes testacées ou en partie rembrunies, sommet de l'abdomen chez ♂ également testacé. Tête, avec les yeux, un peu moins large que le prothorax ; antennes plus longues et moins grêles chez ♂, à 2e article court ; prothorax court, plus large chez ♀ que chez ♂, rétréci en arrière ; élytres un peu plus larges que le prothorax, différents suivant les sexes, concolores et simplement à peine impressionnés au sommet ♀, ou rétrécis en forme de courte queue, impressionnés au sommet et tachés de blanc avant l'extrémité ♂ ; pattes grêles, longues. Long. 3 mill. Himalaya.

Stadenus costatus n. sp. Modice elongatus, parum nitidus, testaceus, oculis, articulis 3-9 antennarum, infra corpore pedibusque pro majore parte nigris, elytris fortiter costatis, testaceis, apice late nigris.

Modérément allongé, un peu brillant, tête, prothorax et deux tiers antérieurs des élytres testacés, dessous et pattes, moins la base des cuisses rousses, noirs ; antennes noires avec les 2 premiers articles roux et les deux derniers testacés, à 3e article court. Prothorax transversal, relevé sur les bords, avec les extrémités de l'aréole très saillantes en dessus ; élytres un peu plus larges que le prothorax, subparallèles, à côtes, 1 et 3 surtout, très saillantes. Long. 11 mill. Afrique occidentale : Kamerun.

Voisin de *S. Bolivari* Brg., mais avec les deux derniers articles des antennes testacés, les cuisses plus foncées, etc.

Stadenus subelongatus. Elongatus, postice parum dilatatus, testaceus, articulis 3-10 antennarum, infra corpore pedibusque (coxis rufescentibus) nigris, elytris testaceis, apice late nigris.

Coloration analogue à l'espèce précédente, mais avec le 10e article des antennes noir et le 3e article long, aréole du prothorax à extrémité peu saillante, élytres de forme plus allongée et à côtes plus égales, moins saillantes. Long. 9 mill. Kamerun.

Stadenus rufifrons n. sp. Elongatus, subparallelus, niger, vertice rufescente, thorace scutelloque testaceis, medio brunneo notatis, elytris testaceis, apice late nigris, articulis 2 ultimis antennarum testaceis.

Allongé, subparallèle, noir, vertex roux, prothorax, écusson (taché de brun au milieu) et élytres testacés, ces derniers largement noirs au sommet ; deux derniers articles des antennes testacés, celles-ci à 3e article long et épais. Prothorax nettement sinué sur les côtés ; élytres un peu plus larges que le prothorax, subparallèles, à côtes égales et saillantes. Long. 8 mill. Benito.

Voisin de *S. antennalis* Brg., mais front roussâtre, écusson rembruni au milieu et prothorax testacé avec l'aréole seule un peu rembrunie.

Stadenus Auberti v. nov. atricollis. Thorace nigro, lateraliter pro parte angustissime rufo cincto, geniculis testaceis. Long. 10 mill. Oubanghi : Fort Sibut.

Diffère au moins de *S. Auberti* Brg. par la coloration presque entièrement foncée du prothorax et par les genoux testacés.

Stadenus Mocquerysi n. sp. Modice elongatus, subnitidus, niger, elytris dimidio basalis rufo-testaceis, articulo ultimo antennarum testaceo.

Modérément allongé, un peu brillant, noir avec seulement la moitié basale des élytres d'un roux testacé et le dernier article des antennes testacé. Antennes à 3e article assez long et épais, subtriangulaire ; prothorax

transversal, sinué sur les côtés ; élytres à peine plus larges que le prothorax, parallèles, à côtes égales et saillantes. Long. 9 mill. Gabon (Mocquerys).

Cette espèce, très distincte par sa coloration, peut se placer près de *S. Auberti* Brg.

Stadenus Mocquerysi v. nov. geniculatus. Articulo secundo antennarum geniculisque rufis. Haut-Chari.

Chauliognatus tricoloricollis n. sp. Paulum nitidus, elongatus, subparallelus, niger, elytris testaceo marginatis, thorace rufo, testaceo limbato, ad basin nigro maculato.

Peu brillant, allongé, subparallèle, noir, élytres bordés de testacé sur tout leur pourtour, prothorax roux au milieu, testacé sur le pourtour et orné, sur le milieu de sa base, d'une petite macule noire. Tête longue, tachée de roux près des antennes ; antennes noires, courtes, un peu épaissies, sauf à leur sommet où elles sont atténuées ; prothorax presque carré, à peu près droit sur les côtés, subarqué en avant ; élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, subparallèles ; pattes moyennes, foncées avec les cuisses et genoux marqués de roux ; abdomen foncé, bordé de clair sur le pourtour. Long. 14 mill. Amérique méridionale.

Peut se placer près de *C. marginatus* F., dont il se distingue, à première vue, par la coloration tricolore de son prothorax, les élytres moins étroits, les antennes plus épaisses.

C. brevenotatus (1) n. sp. ♂. Opacus, elongatus, niger, thorace testaceo, in disco nigro notato.

Mat, allongé, noir avec le prothorax testacé, plus clair sur les côtés et orné d'une macule noire étendue sur presque tout le milieu. Tête longue ; antennes noires, courtes et larges, déprimées sur les articles 3 et suivants, atténuées à l'extrémité ; prothorax presque carré, un peu ré-

(1) Cette espèce et toutes celles qui suivent rentrent dans le genre *Chauliognatus* Hentz.

tréci en avant, plus étroit que les élytres ; élytres allongés, à peine élargis et rebordés vers leur milieu, foncés, vaguement teintés de roux latéralement en dessous des épaules ; pattes moyennes, foncées ; dessous du corps foncé, cupuliforme au sommet. Long. 13 mill. Brésil.

Diffère du précédent par le prothorax un peu rétréci en avant et la coloration ; moins brillant que *C. morio* Gorh., avec le prothorax non arqué sur les côtés.

C. magnicollis n. sp. ♂. Fere opacus, subparallelus, pro parte niger, pro parte luteus, thorace luteo, in disco et postice nigro maculato, elytris luteis, ad basin nigro notatis.

Presque opaque, subparallèle, assez court, en partie noir, en partie jaune avec la tête noire, maculée de jaune, le prothorax et les élytres jaunes et maculés de noir, le premier sur le disque, les seconds sur la base, dessous en partie noir, abdomen flave ; antennes et pattes bicolores, en partie noires, en partie testacées, abdomen flave. Tête assez robuste, pas très longue, antennes grêles, longues ; prothorax large, subarqué en avant ; élytres de la largeur du prothorax, explanés près de la base, subparallèles, relativement courts ; pattes assez grêles ; sommet de l'abdomen entaillé et lobé. Long. 12 mill. Brésil : Rio Grande do Sul.

Sans doute voisin de *C. occipitalis* Kirsch, qui ne m'est connu que par la description, et à placer, d'autre part, près de *C. cardiaspis* Bourg.

C. griseopubens n. sp. Opacus, satis elongatus, testaceus, antennis, pedibus pro majore parte elytrisque nigris, his griseo pubescentibus. Elytris aliquot testaceis (*v. mapirianus*).

Assez allongé, mat, un peu élargi en dessous du milieu des élytres, ces organes étant finement et densément pubescents de gris, testacé avec les antennes, les pattes, moins les cuisses plus ou moins testacées, et les élytres noirs ; parfois les élytres sont testacés, c'est alors la var. nov. *mapirianus*. Tête assez grosse, à labre obscurci ; an-

tennes foncées, assez grêles, filiformes, plus longues chez ♂, à premier article épais ; prothorax transversal, un peu rétréci postérieurement, subarqué en avant ; élytres un peu plus larges que le prothorax, dilatés en dessous du milieu et acuminés au sommet ; pattes assez grêles, foncées avec les cuisses largement testacées à leur base ; dessous du corps un peu brillant, testacé, abdomen échancré au sommet avec un lobe médian ♀, ou cupuliforme ♂. Long. 14-15 mill. Bolivie : Mapiri.

Cette espèce, très distincte par son revêtement gris dense, peut prendre place près de *C. limbatithorax* Pic.

C. semicinctus n sp. Opacus, elongatus, niger, abdomine et thorace pro parte testaceo limbatis, elytris apice breve testaceo marginatis.

Mat, avec le prothorax à peine brillant, allongé, noir avec l'abdomen marginé complètement et le prothorax en partie (la bordure est interrompue sur les côtés au milieu) de testacé, élytres à bordure apicale étroite et testacée, maculés aussi de même sous le repli huméral. Tête assez étroite ; antennes noires, grêles ; prothorax peu large, arrondi sur les côtés, bien plus étroit que les élytres ; élytres assez longs, un peu élargis vers le milieu, ruguleux ; pattes grêles, foncées ; abdomen noir, marginé de testacé-jaunâtre ainsi que le pygidium. Long. 17 mill. Mexique : Mexico.

Voisin de *C. distinguendus* Wat. et très distinct, à première vue, par sa coloration.

C. distinguendus v. nov. inscutellaris. Elytris testaceis, ante apicem nigro maculatis. Mexique : San Benito.

Diffère de la forme type par l'absence de macule noire près de l'écusson.

C. expansus v. nov. innotaticollis. Thorace testaceo, immaculato. Brésil.

En plus du prothorax non maculé de foncé, semble différer par les pointes du sommet des élytres moins prolongées.

C. spinipennis n. sp. Nitidus, supra testaceus, signatu-

ris nigris ornatus, ♂ elytris latis, apice spinosis et humeris prominulis, ♀ satis elongatus. Variat. Elytris signaturis nigris antice obliteratis (*v. sinuatofasciatus*), aut immaculatis (*v. testaceipennis*).

Brillant, orné, sur le prothorax et les élytres, de dessins noirs sur coloration foncière testacée, ♂ à élytres larges, subovalaires, à épaules très saillantes en avant, à côte latérale et sommet épineux, ♀ un peu allongée, à élytres non épineux au sommet et ayant les épaules moins saillantes que le ♂. Tête assez grosse, noire, tachée de roux près des antennes celles-ci noires, grêles ; prothorax très transversal, testacé, à macule discale noire, celle-ci à contours irréguliers ; élytres testacés avec, sur chacun, les dessins noirs suivants : une grande macule noire basale, 2 petites médianes et une fascie étroite ondulée postmédiane. Parfois la macule basale noire des élytres est oblitérée, c'est la **v. nov. sinuatofasciatus.** Rarement les élytres sont entièrement testacés, dépourvus de dessins noirs, c'est alors la **v. nov. testaceipennis.** Dessous du corps et pattes foncés, abdomen testacé. Long. 13-14 mill. Brésil : Rio Pardo (ex Gounelle).

Cette espèce, remarquable par la différence de forme de ses deux sexes et ses dessins élytraux, peut se placer près de *C. expansus* Wat.

C. costatus n. sp. Subnitidus, supra testaceus, signaturis nigris ornatus, thorace in medio elytrisque nigro maculatis.

Un peu brillant, testacé en dessus avec le prothorax et les élytres maculés de noir, la tête noire, tachée de testacé vers les antennes, dessous et pattes en partie foncés, en partie testacés. Tête assez large ; antennes noires, grêles ; prothorax tranversal, testacé, diversement marqué de noir sur le disque ; élytres ♂ ovalaires et larges, épineux au sommet ; ♀ assez allongés, un peu élargis en arrière, rétrécis vers le sommet avec l'angle sutural marqué, ces organes testacés sont ornés chacun d'une macule basale et d'une médiane plus large ♂, ou assez

petite et postmédiane ♀, en plus un trait latéral foncé dans ce dernier sexe. Long. 10-12 mill. Brésil : Rio Pardo (ex Gounelle).

Très voisin du précédent, fascies semblables ; en outre des dessins différents, maculés au lieu d'être fasciés sur les élytres, le ♂ est d'une forme plus courte, la ♀ moins brillante avec les élytres plus nettement costulés, ayant l'angle sutural marqué.

C. quadrifasciatus n. sp Nitidus, paulum elongatus, niger, thorace testaceo limbato, elytris testaceis, nigro quadrifasciatus, fascia prima lata et basalis.

Brillant, peu allongé, noir, prothorax bordé de testacé, élytres testacés, ornés de 4 fascies noires, l'antérieure basale large, les trois autres assez étroites et raccourcies, la dernière éloignée du sommet. Tête petite, antennes noires, grêles ; prothorax transversal, de la largeur des élytres ; élytres pas très longs, à peine élargis au milieu ; dessous du corps et pattes foncés, abdomen en partie testacé. Long. 11 mill. Brésil.

Cette espèce, bien distincte par ses élytres quadrifasciés de noir, peut prendre place près de *C. fallax* Germ.

C. 8-maculatus (Chevr.) n. sp. Subnitidus, paulum elongatus, testaceus, elytris nigro 4 maculatis.

A peine brillant, un peu allongé, testacé, le prothorax étant au milieu peu distinctement maculé de foncé, élytres ayant chacun 4 macules noires, deux avant, deux après, le milieu, dessous du corps et pattes en majeure partie testacés. Long. 9 mill. Brésil.

Diffère du précédent par l'aspect moins brillant, la forme moins allongée et les dessins des élytres différents.

C. 8-maculatus v. nov. semiconjunctus. Signaturis nigris elytrorum pro parte conjunctis, in fasciis dispositis. Brésil: S. Paulo.

C. 8-maculatus v. nov. conjunctus. Signaturis nigris elytrorum late et irregulariter conjunctis. Brésil : S. Paulo.

La première des deux variétés ci-dessus a les macules

noires réunies deux à deux sur chaque élytre, la deuxième ne présente, également sur chaque élytre, qu'une macule discale noire à contours irréguliers et plus ou moins linéolée de testacé au milieu.

C. subgibbosus n. sp. Opacus sed ad basin elytrorum subnitidus, satis latus, flavo-testaceus, capite, antennis, tarsis et infra corpore pro parte nigris, elytris in medio nigro maculatis.

Mat, la partie basale des élytres étant un peu brillante, assez large, testacé-flave avec la tête, les antennes, moins la base, les tarses et partie du dessous noirs, élytres flaves, ornés sur chacun, au milieu du disque, d'une macule noire subtriangulaire à contours irréguliers, cette macule paraissant faite de deux plus petites, juxtaposées et réunies. Tête petite, noire, tachée de testacé vers les yeux ; antennes grêles, courtes ; prothorax très transversal, sinué près des angles postérieurs qui sont un peu saillants, mat, flave, ayant 2 très petites macules postérieures noires, non visibles à l'œil nu ; élytres peu plus larges que le prothorax, nettement élargis en dessous du milieu et rétrécis à l'extrémité, un peu gibbeux sur le milieu, déprimés à l'extrémité ; pattes moyennes ; abdomen testacé. Long. 11 mill. Brésil.

Peut se placer près de *C. maschalostictus* Berg., en diffère, à première vue, par ses élytres maculés de noir et la forme de ces organes.

C. binotaticeps n. sp. Opacus, oblongus, apice attenuatus, flavo-testaceus, pedibus nigris, capite et infra corpore nigro maculatis.

Mat, oblong, atténué postérieurement, testacé-flave avec la tête et le dessous maculés de noir, les pattes noires sauf l'extrême base des cuisses qui est testacée. Tête petite, testacée, quadrimaculée de noir postérieurement ; prothorax transversal, de la largeur des élytres, à angles postérieurs émoussés ; élytres assez longs, de la largeur du prothorax à la base, à peine élargis vers le milieu, rétrécis et acuminés au sommet, avec les angles suturaux

saillants en pointe ; pattes robustes, particulières, cuisses sinuées près du sommet, tibias intermédiaires arqués et un peu dilatés en dedans près de la base, tibias postérieurs longs, sinués, amincis à la base. Long. 10 mill. Brésil : Espirito Santo.

Diffère de *C. saltator* Berg., au moins par la coloration foncée des pattes et les élytres immaculés.

Je rapporte provisoirement à cette espèce, comme variété, sous le nom de **var. nigromaculatus,** un exemplaire de Péry Péry, au Brésil, ayant les pattes robustes, les cuisses largement testacées, et dont chaque élytre est orné de deux macules noires, une près de l'écusson, une latérale vers le milieu. Sa diagnose est : pedibus validis, femoribus late testaceis ; elytris nigro bimaculatis.

C. quadrimaculatus n. sp. Fere opacus, oblongus, rufo-testaceus, capite, antennis, pedibusque pro parte nigris, elytris, ad medium nigro-4 maculatis. Variat : maculis nigris elytrorum bini conjunctis (*var. biconjunctus*).

Presque mat, oblong, roux-testacé, tête d'ordinaire entièrement, antennes, lignes sur les cuisses, tibias et tarses noirs. Elytres ornés de 4 macules médianes noires, isolées (rarement jointes deux à deux : **var. nov. biconjunctus**), deux pour chacun placées un peu en oblique. Tibias normaux ♀, mais arqués ou sinués chez ♂ et élytres nettement granulés postérieurement ♂, ou simplement ponctués ♀. Long. 11-12 mill. Brésil : S. Antonio da Barra (ex. Gounelle).

Par la forme du corps et celle des pattes, très voisin du précédent, mais élytres maculés de foncé et arrondis à l'angle sutural, pattes plus foncées.

TABLE

POUR LE QUATORZIÈME FASCICULE

	Pages.
Introduction	1
Nouveautés rentrant dans diverses familles	2